

LINHA

PÓS-COLHEITA



INSETICIDA COM AMPLO ESPECTRO DE AÇÃO, ATUANDO POR CONTATO E INGESTÃO.

MARCA COMERCIAL:

Pertag 384 EC

REGISTRO NO MAPA:

29317

INGREDIENTE ATIVO (NOME COMUM):

Permetrina (Permethrin)

INGREDIENTE ATIVO (NOME QUÍMICO):

3-Phenoxybenzyl (1RS, 3RS; 1RS, 3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl) -2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

Nº CAS:

52645-53-1

CONCENTRAÇÃO DE INGREDIENTE ATIVO:

384 g/L (38,4% m/v)

FORMULAÇÃO:

Concentrado Emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Piretróide


CLASSE:

Inseticida por contato e ingestão

FÓRMULA BRUTA:

$C_{21}H_{20}Cl_2O_3$

FÓRMULA ESTRUTURAL:



CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA:

Categoria 4 – Produto Pouco Tóxico

CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL:

II – Muito perigoso ao meio ambiente

APRESENTAÇÃO:

Bombona de 5 litros

INDICAÇÕES DE USO:

CULTURA	PRAGA ALVO	DOSE	Nº MÁXIMO DE APLICAÇÕES	ÉPOCA DE APLICAÇÃO E FREQUÊNCIA
MILHO	<i>Sitophilus zeamais</i> Gorgulho	10,5mL / Tonelada (ou 4ppm) diluídos em 200 - 300mL de água	I	O tratamento preventivo dos grãos deve ser realizado durante o carregamento do armazém ou silos graneleiros. Pulverizar a calda sobre os grãos durante o carregamento, utilizando equipamento pulverizador adequado sobre a correia transportadora de grãos, proporcionando sempre cobertura uniforme. Recomendado o uso de tombadores sobre a correia transportadora, de forma que os grãos sejam misturados ao passarem sob a barra de pulverização. Aplicar em grãos limpos, secos e resfriados. Não pulverizar nos grãos ainda quentes, saídos do secador, pois pode reduzir a eficiência do inseticida.
	<i>Sitotroga cerealella</i> Traça-dos-cereais			
	<i>Rhizopertha dominica</i> Besourinho			
ARROZ	<i>Sitophilus zeamais</i> Gorgulho			
	<i>Rhizopertha dominica</i> Besourinho			
TRIGO	<i>Sitophilus zeamais</i> Gorgulho			
	<i>Rhizopertha dominica</i> Besourinho			

DEMAIS INFORMAÇÕES:

VIDE BULA

TELEFONES DE EMERGÊNCIA:

TELEFONES DE EMERGÊNCIA

Comunique o caso e obtenha informações especializadas sobre o diagnóstico e tratamento através dos telefones de emergência.

PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS:

Disque-Intoxicações: 0800-722-6001 (Rede Nacional de Centros de Informações e Assistência Toxicológica RENACIAT ANVISA/MS)

Assistência Toxicológica: 0800-014-1149

ADVERTÊNCIAS:

PROTEÇÃO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE

Estes produtos são perigosos à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita ou faça-o a quem não souber ler. Aplique somente as doses recomendadas. Mantenha afastadas das áreas de aplicação, crianças, pessoas desprotegidas e animais domésticos. Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade. Informe-se sobre o Manejo Integrado de Pragas (MIP). Primeiros socorros e demais informações, vide o rótulo, bula e a receita. Evite a contaminação ambiental, preserve a natureza. Não lave as embalagens ou equipamentos em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água. Não reutilize as embalagens vazias. Descarte corretamente as embalagens e restos ou sobras de produtos. Periculosidade ambiental e demais informações, vide o rótulo, a bula e a embalagem.

CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO E SIGA CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES RECEBIDAS. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO.

PERTAG 384 EC

LINHA

PÓS-COLHEITA



SLUGGO®

LINHA

AGRO



ISCA MOLUSCICIDA DE AÇÃO RÁPIDA PARA APLICAÇÃO
EM TODAS CULTURAS, INCLUSIVE ARROZ IRRIGADO

MARCA COMERCIAL:

Sluggo®

REGISTRO NO MAPA:

02620

INGREDIENTE ATIVO (NOME COMUM):

Fosfato Férrico (Ferric Phosphate)

INGREDIENTE ATIVO (NOME QUÍMICO):

Fosfato Férrico (Ferric Phosphate)

Nº CAS:

10045-86-0; 13463-10-0 (dihidrato)

CONCENTRAÇÃO DE INGREDIENTE ATIVO:

30 g/kg (3,0 % m/m)

TIPO DE FORMULAÇÃO:

Isca (RB)

GRUPO QUÍMICO:

Inorgânico

CLASSE:

Moluscicida fisiológico

FÓRMULA BRUTA:

FePO_4 (ou $\text{FePO}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$)

FÓRMULA ESTRUTURAL:



CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA:

PRODUTO NÃO CLASSIFICADO

CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL:

CLASSE III - PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE

APRESENTAÇÃO:

Saco Plástico de 20 Kg

DEMAIS INFORMAÇÕES:

VIDE BULA

TELEFONES DE EMERGÊNCIA:

TELEFONES DE EMERGÊNCIA

Comunique o caso e obtenha informações especializadas sobre o diagnóstico e tratamento através dos telefones de emergência.

PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS:

Disque-Intoxicações: 0800-722-6001 (Rede Nacional de Centros de Informações e Assistência Toxicológica RENACIAT ANVISA/MS)

Assistência Toxicológica: 0800-014-1149

ADVERTÊNCIAS:

PROTEÇÃO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE

Estes produtos são perigosos à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita ou peça-o a quem não souber ler. Aplique somente as doses recomendadas. Mantenha afastadas das áreas de aplicação, crianças, pessoas desprotegidas e animais domésticos. Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade. Informe-se sobre o Manejo Integrado de Pragas (MIP). Primeiros socorros e demais informações, vide o rótulo, bula e a receita. Evite a contaminação ambiental, preserve a natureza. Não lave as embalagens ou equipamentos em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água. Não reutilize as embalagens vazias. Descarte corretamente as embalagens e restos ou sobras de produtos. Periculosidade ambiental e demais informações, vide o rótulo, a bula e a embalagem.

CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO E SIGA CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES RECEBIDAS. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO.

PERTAG 384 EC


DETIA DEGESCH GROUP

LINHA

PÓS-COLHEITA


DETIA DEGESCH GROUP

SLUGGO®

LINHA

AGRO



BROMETILA

LINHA

PÓS-COLHEITA



Brometila é um inseticida, fungicida e nematicida fumigante indicado exclusivamente para tratamentos quarentenários e fitossanitários dos vegetais, produtos vegetais ou produtos de origem vegetal, madeira e seus subprodutos, e de embalagens e suportes de madeira.

MARCA COMERCIAL:

Brometila

REGISTRO NO MAPA:

00628408

INGREDIENTE ATIVO (NOME COMUM):

Brometo de Metila (Methyl Bromide)

INGREDIENTE ATIVO (NOME QUÍMICO):

Methyl bromide ou bromomethane

Nº CAS:

74-83-9

CONCENTRAÇÃO DE INGREDIENTE ATIVO:

980 g/kg (98 % m/m)

TIPO DE FORMULAÇÃO:

Gás

GRUPO QUÍMICO:

Alifático halogenado


CLASSE:

Inseticida, fungicida e nematicida fumigante

FÓRMULA BRUTA:

CH₃Br

FÓRMULA ESTRUTURAL:



CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA:

Categoria 2 - Produto altamente tóxico

CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL:

Produto altamente perigoso ao meio ambiente

APRESENTAÇÃO:

Cilindro de 100kg

DEMAIS INFORMAÇÕES:

VIDE BULA

TELEFONE DE EMERGÊNCIA:

TELEFONES DE EMERGÊNCIA

Comunique o caso e obtenha informações especializadas sobre o diagnóstico e tratamento através dos telefones de emergência.

PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS:

Disque-Intoxicações: 0800-722-6001 (Rede Nacional de Centros de Informações e Assistência Toxicológica RENACIAT ANVISA/MS)

Assistência Toxicológica: 0800-014-1149

ADVERTÊNCIAS:

PROTEÇÃO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE

Estes produtos são perigosos à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita ou faça-o a quem não souber ler. Aplique somente as doses recomendadas. Mantenha afastadas das áreas de aplicação, crianças, pessoas desprotegidas e animais domésticos. Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade. Informe-se sobre o Manejo Integrado de Pragas (MIP). Primeiros socorros e demais informações, vide o rótulo, bula e a receita. Evite a contaminação ambiental, preserve a natureza. Não lave as embalagens ou equipamentos em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água. Não reutilize as embalagens vazias. Descarte corretamente as embalagens e restos ou sobras de produtos. Periculosidade ambiental e demais informações, vide o rótulo, a bula e a embalagem.

CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO E SIGA CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES RECEBIDAS. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO.

PERTAG 384 EC



LINHA

PÓS-COLHEITA

SLUGGO®



LINHA

AGRO

BROMETILA

LINHA

PÓS-COLHEITA

LINHA



PERTAG 384 EC

LINHA

PÓS-COLHEITA



SLUGGO®

LINHA

AGRO



BROMETILA

LINHA

PÓS-COLHEITA




LINHA



PENTASILO ACA

LINHA

PÓS-COLHEITA



Pentasilos é o silo bolsa produzido pela ACA - Associação de Cooperativas Argentinas. A ACA possui 95 anos de história, e é formada por 155 cooperativas associadas. Os silos bolsa são produzidos com tecnologia de última geração, sua fórmula comprovada, permite a co-extrusão de 5 camadas homogêneas que garantem um produto de alta hermeticidade.

CARACTERÍSTICAS:

- Sua composição com 5 camadas, oferece maior impermeabilidade, hermeticidade, elasticidade, plasticidade e resistência mecânica ao rasgo.
- Proteção contra raios UV.
- Fabricado com controle automático de espessura de ponta a ponta.
- Alto nível de opacidade em sua camada interna.
- O Pentasilos ACA é produzido com matéria-prima virgem de primeira qualidade e mais alto padrão, o que garante suas propriedades mecânicas notáveis.

PENTASILO ACA REFORÇADO:

Espessura: 230 micra
Diâmetro: 2,74 metros
Largura: 60 metros

Capacidade: 180/200 toneladas. Há uma variação que depende do produto armazenado.

PENTASILO ACA GRÃO:

Espessura: 200 micra


Diâmetro: 2,74 metros

Largura: 60 metros

Capacidade: 180/200 toneladas. Há uma variação que depende do produto armazenado.

BENEFÍCIOS:

- Armazenamento flexível com custo competitivo e fácil implementação.
- Alternativa logística devido à falta de estrutura nos campos arrendados.
- Evita alto custo de frete durante o pico da colheita.
- Ideal para empresas com sistemas de rastreabilidade.
- Pode ser usado para silagem.
- Baixo investimento.
- Colheita ininterrupta. Redução da exposição do produto às intempéries - céu aberto.



PERTAG 384 EC

LINHA

PÓS-COLHEITA



SLUGGO®

LINHA

AGRO



BROMETILA

LINHA

PÓS-COLHEITA



LINHA



PENTASILO ACA

LINHA

PÓS-COLHEITA



ÁCIDOS ORGÂNICOS -
BACTEMIX®

LINHA

PÓS-COLHEITA

EFICAZ NO CONTROLE DE SALMONELLA SPP.



BENEFÍCIOS:

- Previne a proliferação de bactérias patógenas, como a *Salmonella* spp., *Escherichia coli* em matérias-primas e rações.
- Previne a contaminação da ração por bactérias patógenas.
- Atua como acidificante de rações no trato gastrointestinal dos animais.
- Reduz a carga ambiental de nitrogênio e fósforo.
- Pouco corrosivo a metais.
- Mais seguro por não conter formaldeído.
- Classificado como mercadoria não perigosa.

PRINCIPAIS COMPONENTES:

Ácido fórmico: CAS Nº. 64-18-6

Ácido propiônico: CAS Nº. 79-09-4

Formato de sódio: CAS Nº. 141-53-7

DESCRIÇÃO:

BacteMix® é um bactericida líquido ideal para controlar a carga bacteriana em matérias-primas e rações.

MODO DE AÇÃO:

Os atuais sistemas de produção nos quais a concentração de animais determina um maior risco de propagação de doenças e zoonoses (salmonelose, etc.) implicam maior controle sobre as matérias-primas utilizadas na produção de rações e nos produtos finais.

A combinação dos ácidos fórmico e propiônico tem um efeito sinérgico e isso o transforma em um bacteriostático e bactericida muito eficiente.

AÇÃO ANTIMICROBIANA:

O modo de ação do BacteMix® está baseado na redução do pH na ração e na atividade antimicrobiana dos ácidos, especialmente do ácido fórmico.

Testes realizados comprovaram a eficácia do BacteMix® contra a *Salmonella* spp. e *Escherichia coli*, tanto em rações quanto em matérias-primas. A atividade antimicrobiana está baseada na capacidade da forma não dissociada dos ácidos para penetrar na célula da bactéria onde são dissociados em prótons e ânions. Os prótons reduzem o pH dentro da célula, interrompendo o equilíbrio de balanço do pH. O

restabelecimento de equilíbrio do pH consome energia do crescimento da célula e inibe a síntese de numerosas macro moléculas vitais. O ânion dissociado tem um efeito nocivo na síntese do DNA e na síntese das proteínas. Essas mudanças evitam a proliferação de bactérias patógenas na ração.

ACIDIFICAÇÃO:

A acidificação da ração contribui para que pintinhos e leitões mantenham o pH gástrico sem variações perante mudanças de dieta e situações de estresse.

DOSE RECOMENDADA:

	%	Kg/ton
Matérias-primas*	0,2-1,5	2-15
Rações	0,2-1,0	2-10

* A dose dependerá da origem da matéria-prima (animal ou vegetal), e das condições de manejo e armazenagem.

PROPRIEDADES QUÍMICAS E FÍSICAS:

Aspecto: Líquido

pH: 3,5

Densidade: 1100 kg/m³

EMBALAGEM, MANEJO E ARMAZENAMENTO:

Disponível em tambores de 220 kg, IBC de 1100 kg, e a granel. Para instruções de manuseio, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico.

PERTAG 384 EC

LINHA

PÓS-COLHEITA

SLUGGO®

LINHA

AGRO

BROMETILA

LINHA

PÓS-COLHEITA



LINHA



PENTASILO ACA

LINHA

PÓS-COLHEITA



**ÁCIDOS ORGÂNICOS -
BACTEMIX®**

LINHA

PÓS-COLHEITA



ÁCIDOS ORGÂNICOS - MOLDPRO®

Linha

PÓS-COLHEITA



MoldPro®

BLOQUEIE A AÇÃO DOS FUNGOS E MICOTOXINAS COM MOLDPRO®.

BENEFÍCIOS:

- Previne a deterioração de alimentos e perda de nutrientes.
- Previne o desenvolvimento de fungos.
- Previne o acúmulo de toxinas.
- Pouco corrosivo a metais. Acoplamentos de plástico podem ser utilizados.

PRINCIPAIS COMPONENTES:

Ácido propiônico: CAS Nº. 79-09-4

Ácido fórmico: CAS Nº. 64-18-6

Formato de sódio: CAS Nº. 141-53-7

DESCRIÇÃO:

MoldPro® é um produto formulado para controlar fungos em cereais e rações.

MoldPro® apresenta a mesma eficácia antifúngica do ácido propiônico puro, porém é mais fácil de usar, pois é pouco corrosivo a metais.

MODO DE AÇÃO:

A contaminação por fungos reduz o valor nutritivo dos alimentos, já que destrói os nutrientes e afeta a palatabilidade. Alguns fungos produzem micotoxinas que possuem diversos efeitos nocivos sobre a produtividade animal ou que colocam em risco a saúde animal e humana. Estima-se que aproximadamente 25% dos cereais produzidos ao redor do mundo sejam contaminados por micotoxinas conhecidas. O crescimento de fungos e consequentemente, a formação de micotoxinas são intensificados pela alta temperatura e níveis de umidade elevados na presença de oxigênio. O ácido propiônico e o formato de sódio evitam a formação de fungos, por consequência a formação de micotoxinas. A forma não dissociada do ácido penetra na parede celular e interrompe o metabolismo dos carboidratos e a síntese de DNA nos microrganismos.

TESTES:

Testes realizados com MoldPro® demonstraram uma alta efetividade no controle da maioria dos fungos frequentemente encontrados nos cereais e nas rações: *Fusarium*, *Aspergillus*, *Penicillium*, etc.

DOSE RECOMENDADA:

	%	Kg/ton
Matérias-primas*	0,1 – 1,0	1 – 10
Rações	0,1 – 0,4	1 – 4

* Ajustar a dose em função da umidade, do tempo de armazenagem e das condições de armazenagem

- Adicione mais 10% à dose recomendada em rações não peletizadas.
- Não ventile ou movimente o alimento conservado durante o armazenamento.

PROPRIEDADES QUÍMICAS E FÍSICAS:

Aspecto: Líquido

pH: 3,5 - 4

Densidade: 1150 kg/m³

EMBALAGEM, MANEJO E ARMAZENAMENTO:

Disponível em tambores de 230 kg, IBC de 1150 kg, e a granel. Para informações sobre transporte, manuseio, armazenagem e ações de emergência, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico.

PERTAG 384 EC



LINHA

PÓS-COLHEITA



SLUGGO®

LINHA

AGRO



BROMETILA

LINHA

PÓS-COLHEITA



LINHA



PENTASILO ACA

LINHA

PÓS-COLHEITA



ÁCIDOS ORGÂNICOS -
BACTEMIX®

LINHA

PÓS-COLHEITA



ÁCIDOS ORGÂNICOS - MOLDPRO®

LINHA

PÓS-COLHEITA



ÁCIDOS ORGÂNICOS - SALPRO®
2500

LINHA

PÓS-COLHEITA



BARREIRA DE PROTEÇÃO NO CONTROLE DE
SALMONELLA SPP. E DE OUTRAS BACTÉRIAS EM
MATÉRIAS-PRIMAS E RAÇÕES.

BENEFÍCIOS:

- Previne a proliferação de bactérias patogênicas, como a *Salmonella spp.*, *Escherichia coli* e *Campilobacter spp.* em matérias-primas e rações.
- Previne a contaminação da ração por bactérias patogênicas.
- Atua como acidificante de rações no trato gastrointestinal dos animais.
- Reduz o risco de contaminação patogênica em animais e em seres humanos.
- Pouco agressivo à pele.
- Pouco corrosivo a metais.
- Mais seguro por não conter formaldeído.
- Classificado como mercadoria não perigosa.

PRINCIPAIS COMPONENTES:

Ácido fórmico: CAS Nº. 64-18-6

Ácido propiônico: CAS Nº. 79-09-4

Formato de sódio: CAS Nº. 141-53-7

DESCRIÇÃO:

SalPro® 2500 é um produto líquido elaborado para o controle de bactérias patogênicas em matérias-primas e em rações fornecidas aos animais.

SalPro® 2500 é um produto fácil de usar, pouco agressivo à pele e pouco corrosivo a metais. Não está classificado como produto perigoso.

MODO DE AÇÃO:

As bactérias patogênicas, como a *Salmonella* spp., *Campylobacter* spp. e *Escherichia coli*, são um problema mundial, especialmente na suinocultura, avicultura e na aquicultura. Rações contaminadas podem afetar os animais, levando à contaminação de suas carcaças e descendentes. Essa contaminação é facilmente transmitida aos humanos por meio de produtos animais.

SalPro® 2500 é indicado para descontaminar as bactérias patogênicas presentes em matérias-primas, rações e para prevenir a contaminação no produto final. Mediante o emprego da combinação dos ácidos fórmico e propiônico, obtém-se a descontaminação a um pH mais elevado que com apenas um ácido.

AÇÃO ANTIMICROBIANA:

O modo de ação do SalPro® 2500 está baseado na redução do pH na ração e na atividade antimicrobiana dos ácidos, especialmente do ácido fórmico. O pH deveria estar próximo de 4 para prevenir o crescimento de bactérias patogênicas, como por exemplo a *Salmonella* spp.

A atividade antimicrobiana se deve à capacidade da forma não dissociada dos ácidos para penetrar na célula da bactéria onde são dissociados em prótons e ânions. Os prótons reduzem o pH dentro da célula, interrompendo o equilíbrio do balanço do pH.

O restabelecimento do equilíbrio do pH consome a energia do crescimento da célula e inibe a síntese de numerosas macro moléculas vitais. O ânion dissociado tem um efeito nocivo na síntese do DNA e na síntese das proteínas. Essas mudanças evitam a proliferação da bactéria patogênica no alimento.

Testes realizados comprovaram a grande eficácia do SalPro® 2500 contra *Salmonella* spp, *Escherichia coli* e *Campylobacter* spp, tanto em ração quanto em matérias-primas de origem vegetal (farelo de soja, milho, etc.) e animal (farinha de vísceras, peixe, etc.).

ACIDIFICAÇÃO:

A acidificação da ração contribui para que pintinhos e leitões se adaptem à mudança da dieta e ambiente, quando são transferidos da incubadora ou desmama para a unidade de engorda. SalPro® 2500 demonstrou ser eficaz na redução de *Salmonella* spp., tanto no intestino quanto nas carcaças das aves, bem como na cama de frango. Isso reduz o risco de transmissão aos animais e no consumidor final.

DOSE RECOMENDADA:

	%	Kg/ton
Matérias-primas*	0,1 – 1,0	1 – 10
Rações	0,2 – 0,4	2 – 4

* A dose dependerá da origem da matéria-prima (animal ou vegetal), e das condições de manejo e armazenagem.

PROPRIEDADES QUÍMICAS E FÍSICAS:

Aspecto: Líquido

pH: 3,0

Densidade: 1250 kg/m³

EMBALAGEM, MANEJO E ARMAZENAMENTO:

Disponível em tambores de 250 kg, IBC de 1250 kg, e a granel. Para informações sobre transporte, manuseio, armazenagem, e ações de emergência, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico.

PERTAG 384 EC



LINHA

PÓS-COLHEITA

SLUGGO®



LINHA

AGRO

BROMETILA



LINHA

PÓS-COLHEITA



LINHA

PENTASILO ACA

LINHA

PÓS-COLHEITA

ÁCIDOS ORGÂNICOS -
BACTEMIX®

LINHA

PÓS-COLHEITA

ÁCIDOS ORGÂNICOS - MOLDPRO®

LINHA

PÓS-COLHEITA



ÁCIDOS ORGÂNICOS - SALPRO®
2500

LINHA

PÓS-COLHEITA



STORESEAL®

LINHA

PÓS-COLHEITA



StoreSeal®
Revitalização
Vedação
Impermeabilização

StoreSeal®

- Maior agilidade no processo de revitalização.

- Proteção anticorrosiva.
- Impermeabilização / Estanqueidade.
- Aumento da vida útil do substrato em até 25 anos.
- Reduz perdas no período de armazenagem.

StoreSeal® Revitalização

Revestimento anticorrosivo monocomponente de baixa espessura para chapéu e chaparia de silos.

StoreSeal® Vedação

Revestimento anticorrosivo monocomponente de alta espessura. Utilizado para vedação de parafusos, emendas de chapas e pequenas frestas. Possível aplicação com sistema airless.

StoreSeal® Impermeabilização

Revestimento anticorrosivo monocomponente de alta espessura. Utilizado para proteção de interface metal/concreto. O único com grafeno na fórmula.

PERTAG 384 EC



LINHA

PÓS-COLHEITA

SLUGGO®



LINHA

AGRO

BROMETILA



LINHA

PÓS-COLHEITA



LINHA

PENTASILO ACA

LINHA

PÓS-COLHEITA

ÁCIDOS ORGÂNICOS -
BACTEMIX[®]

LINHA

PÓS-COLHEITA

ÁCIDOS ORGÂNICOS - MOLDPRO[®]

LINHA

PÓS-COLHEITA



ÁCIDOS ORGÂNICOS - SALPRO[®]
2500

LINHA

PÓS-COLHEITA



STORESEAL[®]

LINHA

PÓS-COLHEITA



XERIFE GRÃO INTEGRAL

LINHA

SAÚDE AMBIENTAL



GRÃOS DE GIRASSOL DESCASCADOS

MARCA COMERCIAL:

Xerife Grão Integral

REGISTRO NO MS:

3.3428.0006.001-7

INGREDIENTE ATIVO (NOME COMUM):

Brodifacum (Brodifacoum)

INGREDIENTE ATIVO (NOME QUÍMICO):

3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin

Nº CAS:

56073-10-0

CONCENTRAÇÃO DE INGREDIENTE ATIVO:

0,005% p/p

FORMULAÇÃO:

Grão Integral (girassol descascado)

GRUPO QUÍMICO:

Cumarínico


CLASSE:

Raticida

FÓRMULA BRUTA:

$C_{31}H_{23}BrO_3$

FÓRMULA ESTRUTURAL:



APRESENTAÇÕES:

Saco de 1Kg contendo 50 sachês de 20g

INDICAÇÕES DE USO:

Xerife Grão Integral é um raticida anticoagulante de dose única, na forma de girassol descascado, altamente atrativo e palatável aos roedores, indicado para o controle de ratos, ratazanas e camundongos.

MODO DE APLICAÇÃO:

Xerife Grão Integral deve ser colocado onde os roedores vivem e transitam como tocas, trilhas, túneis, etc. De acordo com o nível de infestação, aplicar de 20 a 100g por ponto de iscagem, respeitando uma distância de 5 a 10 metros um do outro. Recomenda-se o uso de caixas porta-iscas para proteger o produto das intempéries e dificultar o acesso de espécies não alvo ao raticida. Os pontos de iscagem devem ser inspecionados a cada 7 dias para verificação do consumo e remanejamento nos locais onde as iscas não forem consumidas.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo Químico: Cumarínico

Nome Comum: Brodifacoum

Antídoto: Vitamina K1

Telefone de Emergência: 0800-0141149

DISQUE INTOXICAÇÃO: 0800-7226001

ADVERTÊNCIAS:

**VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU
EMPRESAS ESPECIALIZADAS.
PROIBIDA VENDA LIVRE**

Estes produtos são perigosos à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Antes de usar leia atentamente as instruções do rótulo. Aplique somente as doses recomendadas. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade. Descarte corretamente as embalagens.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA:

TELEFONES DE EMERGÊNCIA

Comunique o caso e obtenha informações especializadas sobre o diagnóstico e tratamento através dos telefones de emergência.

PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS:

Disque-Intoxicações: 0800-722-6001 (Rede Nacional de Centros de Informações e Assistência Toxicológica RENACIAT ANVISA/MS)

Assistência Toxicológica: 0800-014-1149